

# NAP 19

*Nawóz dolistny*

## NPK 19-19-19

Rozpuszczalny nawóz NPK  
z mikroelementami schelatowanymi  
EDTA i DTPA

NAWÓZ DOLISTNY ZAWIERAJĄCY NAJWAŻNIEJSZE  
MAKRO + MIKROELEMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA  
ROŚLIN. MIKROSKŁADNIKI W POSTACI CHELATÓW. SKŁADNIKI ODŻYWCZE  
OPTYMALNIE DOBRANE DO FIZJOLOGICZNYCH POTRZEB I PRAWIDŁOWEGO  
ROZWOJU ROŚLIN, GWARANTUJĄ MAKSYMALNĄ PRZYSWAJALNOŚĆ  
W KLUCZOWYCH STADIACH ROZWOJU ROŚLINY.



# NAP 19

Opakowanie 15 kg masa netto.

# NAP 19

## Cechy szczególne nawozu NAP 19:19:19 :

- mikroelementy w formie chylatów EDTA i DTPA
- zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju i wydania możliwie wysokiego jakościowo i ilościowo plonu
- dzięki dobremu odżywianiu roślin wpływa na poprawną zdrowotność i zwiększa odporność
- nawóz szybko i całkowicie rozpuszczalny

## Nawóz dolistny

### NPK 19-19-19

Rozpuszczalny nawóz NPK  
z mikroelementami schelatowanymi  
EDTA i DTPA

Zawartość składników pokarmowych [% m/m]			
Azot całkowity	(N)	19,00	-
Azot amidowy	(NH <sub>2</sub> )	18,00	-
Azot amonowy	(NH <sub>4</sub> )	1,00	-
Pięciotlenek fosforu	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	19,00	rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
Pięciotlenek fosforu	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	19,00	rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu	(K <sub>2</sub> O)	19,00	rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki	(SO <sub>3</sub> )	10,00	rozpuszczalny w wodzie
Bor	(B)	0,05	rozpuszczalny w wodzie
Miedź	(Cu)	0,07	rozpuszczalny w wodzie
Żelazo	(Fe)	0,10	rozpuszczalny w wodzie
Mangan	(Mn)	0,07	rozpuszczalny w wodzie
Cynk	(Zn)	0,05	rozpuszczalny w wodzie
Molibden	(Mo)	0,05	rozpuszczalny w wodzie



NAWÓZ WE TYP : B.1.1.

### Instrukcja stosowania nawozu:

Nawóz należy rozpuścić w 200-400 l wody. Bezpośrednio przed zabiegami napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło. Dodać stopniowo ustaloną dawkę nawozu. Po rozpuszczeniu dopełnić zbiornik opryskiwacza wodą i przystąpić do opryskiwania.

NAWÓZ NPK (S)  
19-19-19 (10)  
Z MIKROSKŁADNIKAMI POKARMOWYMI  
„MIESZANKA”

### Zalecane dawki:

Roślina	Terminy oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
Rzepak, len	ruszenie wegetacji	3÷4
	10÷14 dni później	
	faza zielonego pąka	
Burak cukrowy i pastewny	faza 4+10 liści	3÷4
	10÷14 dni później	
	przed zwarciem rzędów	
Zboża	krzewienie	2+3
	strzelanie w źdźbło	3+4
	kłoszenie	
	po kwitnieniu	
Ziemniak	pełnia wschodów	3+4
	przed kwitnieniem	
	po kwitnieniu	
Kukurydza	faza 6+8 liści	3+4
	co 10÷14 dni - dwa zabiegi	
	co 10÷14 dni - dwa zabiegi	

  
**napena**  
sp. z o.o.

**Napena Sp. z o.o.**  
64-500 Szamotuły  
ul. Swidlińska 1  
tel./fax 61/29 20 108  
tel. kom. 661 934 325  
sekretariat@napena.pl  
[www.napena.pl](http://www.napena.pl)

**Zadzwoń po poradę**  
Filip Nawrowski tel. **661 934 315**  
Aldona Jessa tel. **661 934 309**

